

交差反応アレルゲン類 一覧

アレルギー		交差性を示すもの					
草	ギョウギシバ	セントオーガステイングラス					
	スズメノチャヒキ属の植物	オオムギ	ライムギ				
	セイバンモロコシ	コーン	穀草	サトウキビ			
雑草	オナモミ	メロン	スイカ	ラテックス	セロリ	ヒマワリ	バナナ
	タンポポ	ヒマワリ	レタス				
	ギシギシ	ギシギシ属					
	セイヨウオオバコ	オオバコ	メロン				
	セイタカアワダチソウ	バッカリス	ヒマワリ				
	ニワトコ	セロリ バナナ	ヒマワリ ラテックス	メロン	スイカ		
	ブタクサ	ヒマワリ ラテックス リンゴ*	メロン レタス ズッキーニ*	スイカ タンポポ 糖蜜*	セロリ トマト カモミール茶葉*	バナナ セイタカアワダチソウ	キュウリ
	ヨモギ (sage brush)	ニンジン キウイ*	セロリ メロン*	ウイキョウ コショウ*	カパノキ パセリ*	リンゴ スイカ*	ヒマワリの種* ピーナッツ*
樹木	カパノキ(シラカバ)	リンゴ クリノキ ソバ* ブルー* ピーナッツ*	セロリ ブナ 蜂蜜* パセリ* ハウレンソウ*	ニンジン トネリコ バセリ* コショウ*	ジャガイモ キウイ コショウ*	トマト アズ* プラム*	アーモンド ヘーゼルナッツ* サクランボ*
	カエデ (北米原産)	メーブル					
	ニレ	ニレ属					
	ハシバミ	クリノキ	ブナ	リンゴ	アーモンド		
	ビャクシン	スギ					
	スギ*	トマト					
	オーク	クリノキ	ブナ				
	オリーブ	ライラック	サフラン				
	トウヒ (エゾマツ含む)	モミノキ	マツ				
	スズカケノキ (米)	プラタナス属					
	オオカエデ (英)						
	ハンノキ*	アーモンド パセリ	リンゴ 洋梨	セロリ 桃	サクランボ	ヘーゼルナッツ	
食物	牛肉	牛乳 鶏肉	牛上皮 鶏肉	羊肉	豚肉	馬肉	
	鶏肉	七面鳥	ウズラ	鶏卵	ウズラの卵		
	ミルク	チーズ	乳漿	山羊乳			
	マメ	ピーナッツ	インゲンマメ				
	コーン	サトウキビ	セイバンモロコシ				
	七面鳥	鶏肉					
	穀草 (ソルガム)	コーン	サトウキビ	セイバンモロコシ			
	オートミール (カラスムギ)	ソバ					
	ポテト	ピーマン	ナス	フトモモ科の木 (実)			
	マグロ	サケ	オヒョウ				
	タラ	タラ科	ウナギ	サバ			
	ニンジン	セロリ キウイ	ウイキョウ	パセリ	キュウリ	スイカ	リンゴ
	エンドウマメ	ピーナッツ	大豆	インゲンマメ			
室内	ゴキブリ**	甲殻類 (エビ・カニ)					

*: サンダース ペテリナリークリニクスシリーズ Vol.2 No.1『犬と猫の最新・皮膚科学』株式会社インターズー刊 より引用

** : Allergy 50: 918-924 (1995)より引用